

NORMAS PARA EL USO DEL BOTIQUÍN

HERIDAS

LAVAR CON AGUA Y JABÓN
SECAR CON GASA, APLICAR
ANTISÉPTICO Y CUBRIR
CON APOSITO

HEMORRAGIAS

APLICAR GASA EN PUNTO
SANGRANTE Y EFECTUAR
COMPRESIÓN DIRECTA

LIPOTIMIA

PONERLE TUMBADO CON
LA CABEZA MÁS BAJA
QUE EL RESTO DEL CUERPO

INHALACIÓN DE GASES

SACAR AL AIRE LIBRE,
REALIZAR RESPIRACIÓN
ARTIFICIAL

QUEMADURAS

AGUA ABUNDANTE
EN LA ZONA, CUBRIR
CON GASA ESTÉRIL

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA

1. PROTEGER
2. AVISAR

**TELÉFONOS
EMERGENCIAS 112
AMBULANCIAS 061**

3. SOCORRER

SALPICADURAS EN LOS OJOS

LAVAR CON AGUA CORRIENTE
A BAJA PRESIÓN 20 MINUTOS,
TAPAR Y ACUDIR AL MÉDICO


CONTENIDO MÍNIMO EN BOTIQUÍN

- AGUA OXIGENADA
- ALCOHOL
- ANALGÉSICOS:
ACIDO ACETILSALICÍLICO,
PARACETAMOL
- ANTISÉPTICO:
MERCUROCROMO, YODO
- ESPARADRAPO
- GASAS ESTÉRILES
- PINZAS Y TIJERAS
- TIRITAS Y VENDAS
- GUANTES DESECHABLES
- Además, en LABORATORIOS:
Si no existe fuente LAVA OJOS:
• SUERO FISIOLÓGICO
• LINTIL

RECOMENDACIONES EN EL USO DEL BOTIQUÍN

- LOS MEDICAMENTOS SE UTILIZARÁN DE FORMA RACIONAL
- NO USARLOS FUERA DEL ÁMBITO LABORAL
- TRAS HACER USO DEJARLOS TAPADOS Y EN SU SITIO
- EL MATERIAL SERÁ EXCLUSIVO DE PRIMEROS AUXILIOS
- VERIFICAR FECHA DE CADUCIDAD
- ANTES DE AGOTAR EXISTENCIAS AVISE AL SERVICIO DE PREVENCIÓN 36.72.13 DONDE SE ATENDERÁ SU PETICIÓN DE REPOSICIÓN DE MATERIAL Y CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN
- COORDINADOR BOTIQUINES:
D. Santiago Pina García

ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA MÉDICA



UNIVERSIDAD
DE MURCIA

GERENCIA
Servicio de Prevención

ibermutuamur

Miembros de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social n.º 274

www.ibermutuamur.es